

HAIGUSJUHU ARUTELU

Veronika Iljina
Ida-Viru Keskhaigla



TB haige iseloomustus 2014

(esmased ja retsidiivid, n= 236)

- Mehi **69,9 %**
- Keskmise vanus **48,8** (7 - 90 a)
- Kodutu või juhuslik elukoht 8,5%
- **Probleeme alkoholiga ja/või narkootikumidega 104 (44,0%)**
- **Vanglates ja Narvas diagnoositud TB juhtudest ligi 60% HIV+**
- Eestis sündinud 81,8% (eestlasi 56,4%)
- Töötuid 56 (23,7%)
- Viibinud kinnipidamiskohas 42 (17,8%)



Naltreksoon

- Aletes 2014.a. Augustist on 3 patsienti alustanud ravi Naltreksooniga
- Miks on vaja alustada ravi naltreksooniga?
- Patsiendi arusaamise, käitumise muutus?
- *Tab. Naltrexoni 50mg x 1*
- Kõrvaltoimete osas probleeme ei ole (iiveldus, maksa proovide tõus)
- Ambulatoorne naltreksoon: patsient käib ühes kohas ravimite järgi (TB, Naltrexon)
- **Naltreksoon (REVIA)** on ravim, mis võtab ära alkoholi tarvitamisega kaasneva mõnutunde, vähendab himu alkoholi järele toetab loobumist alkoholist. Ravi toimib efektiivselt koos nõustamise või psühhoteraapiaga.

Opioidisõltuvuse korral võib kasutada naltreksooni täiendava ravimina desintoksikatsiooni alalhoidmiseks patsientidel, kes ei ole vähemalt 7...10 päeva opiaati kasutanud¹.

Abi teenuste kaasamine

- **Sotsiaaltöötaja**
 - Nõustamine
 - Sotsiaalhoolekande ankeedi täitmine, sotsiaalne abi
 - Audit-testi läbiviimine, arutelu
- **Psühholoog** (IVKH Taastusravi kliinikust)
 - Konsulterimine
 - nõustamine
- **Psühhiaater** (Psühhiaatria Haigla)
- **Tegevusterapeut**: puudub

Meespatsient, 39.a.v.

- Viibis ravil IVKH Tuberkuloosiosakonnas 08.08.2014 – 23.12.2014
- Diagnoos:
 - A 15.0 Infiltratiivne kopsutuberkuloos lagu- ning disseminatsioonifaasis 0/1c2, MBT positiivne
 - A 16.5 Tuberkuloosne pleuriit
 - F 10.20 Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired sõltuvus, käesolevalt kaine
 - G 40.4 Epileptilised sündroomid
- Alates 28.08.2014 alustatud ravi Naltreksooniga
- 23.12.2014 lubatud ambulatoorsele ravile OKR kabinetis
- OKR kabinetis ei ole käinud
- Otsitud sotsiaaltöötaja poolt
- Hospitaliseeritud korduvalt tuberkuloosiosakonda 02.01.2015
- Üle viidud edaspidiseks raviks SA Viljandi Haiglasse

Meespatsient, 39.a.v.

- Enne Naltreksooniga ravi alustamist patsienti konsulteeritud:
 - Sotsiaaltöötaja poolt
 - Psühholoogi poolt
 - Psühhiaatri poolt
- Konsiiliumil otsustati alustada sõltuvusravi patsiendi nõusolekul.
- 1, 2, 3 kuu pärast ravi saamist:
 - Korduvad konsultatsioonid, jätkas ravi
- Pärast väljakirjutamist kodusele ravile hakkas kuritarvitama alkoholi

Meespatsient, 30.a.v.

- Suunatud infektionisti poolt Mükobakterioosi ravi saamiseks: verest ja bronhiloputus vedelikust on *M. aviumi* kasv.
- Patsient sai ARV ravi 2011.aastal, mille ta katkestas.
- Detsembris 2013 oli hospitaliseeritud Nakkusosakonda raskes üldseisundis, kus oli alustatud ARV ravi korduvalt: Kivexaga, Kaletraga
- Patsient on saanud pikaajaliselt MAR 60ml
- Raviks OKR kabinets on määratud E, Lfx, Am
- Täiendavalt MAR, ARV (sai kõiki ravimeid OKR kabinets 1 kordselt, v.a. Kaletra õhtuse annuse)
- Sai ravi 1 aasta jooksul, on paranenud.
- Ravi oli ambulatoorne, ei ole katkestanud ühtegi päeva
- Ravi käigus oli aeg - ajalt tugeva alkoholi lõhnaga, sai jalaluumurru. Vaatamata sellele käis ravimite järgi regulaarselt.